



@martinez crop protection

Marti Amino

Aminoácido

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO ORGANOMINERAL DE (L - AMINOÁCIDOS) MÁS AGENTES VITAMINICOS PROMOTORES DE ENERGÍA

Bioestimulante balanceado rico en (L - aminoácidos) más agentes vitamínicos promotores de energía, activadores del proceso metabólico de la planta tanto enzimática como hormonal. Formadores de proteínas y precursor de los procesos más importantes en el desarrollo de la misma, como floración, fructificación, desarrollo radicular, desarrollo y engorde de fruto, quelata con fulvato orgánico mineral y carboxílico.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Aumenta la floración, disminuyendo el número de abortos florales y regulando los procesos osmóticos.
- ✓ Indispensables para una excelente floración, combinados con micro elementos que incrementan el peso y sabor de los frutos.
- ✓ Potencian la absorción de nutrientes minerales, facilitando su transporte a través de la savia.
- ✓ Aceleran la recuperación de plantas sometidas a condiciones adversas, tales como: trasplantes, transportes, heladas, viento, granizo, poda, asfixias, efectos tóxicos de tratamientos fitosanitarios, etc.
- ✓ Incrementan la consistencia, peso y calidad de frutos, tubérculos, bulbos, granos, flores, y follajes, además alarga la vida de anaquel.



TU CULTIVO, NUESTRA PASIÓN

Marti Amino

Aminoácido

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (%)

Complejo de (L-Aminoácidos): Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Cisteína, Fenilalanina, Treonina, Triptófano, Valina, Hidroxiprolina, Tirosina, Histidina, Alanina, Aspártico, Prolina, Glicina, Isoleucina, Glutámico.	25.00
Ácido Glutámico	1500 ppm
Complejo de Vitamina B: B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotina, Ácido Pantoténico, Vitamina C.	1500 ppm
Fulvato Organico Mineral	3.00
Agentes Carboxilados	2.00
Acondicionadores	69.70
TOTAL	100.00

CULTIVOS	DOSIS LT/HA	MÉTODO
Repollo Brócoli Lechuga Calabacita Melón Sandía Zanahoria Rábano Jitomate Pepino Papa Tomate cáscara Cebolla Cebollín Chile Nopal Chicharo	1.0 - 2.0	-Se aplica a los 15 días después del trasplante. -Mantenimiento vegetativo. -Estrés por causa de frío o calor. -Inducción de brotación de nuevas yemas. -Inicio de floración.
Frutos templados	2.0 - 3.0	-Inicio de floración. -Desarrollo y engorde de fruto. -Estrés por factores ambientales.
Granos y Cereales: Maíz Caña Trigo Sorgo	2.0 - 3.0	-Inicio de floración. -Desarrollo y engorde de fruto. -Estrés por factores ambientales.