



Marti Max

Foliar

FERTILIZANTE LÍQUIDO ORGANOMINERAL ACTIVADOR DEL DESARROLLO Y BALANCEADOR DE CULTIVOS AGRÍCOLAS.

Es un complejo organomineral balanceado rico en N-P-K, activado con agentes orgánicos minerales más promotores de energía, que activan los procesos de desarrollo en equilibrio de los cultivos agrícolas, por su alto contenido de materiales orgánicos y vitaminas mejoran la calidad de cultivos hortícolas, ornamentales, frutales, granos y cereales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estimulante celular y de la zona radicular.
- ✓ Ayuda a la absorción óptima de agua y nutrientes minerales.
- ✓ Aumenta la velocidad del desarrollo y crecimiento de los cultivos en su fase inicial.
- ✓ De rápida asimilación por sus agentes quelantes y activadores metabólicos orgánicos.
- ✓ Incrementa la consistencia, peso y calidad de frutos, tubérculos, bulbos, granos, flores y follajes, además alarga la vida de anaquel.
- ✓ Por su contenido de ácidos fúlvicos derivados de materia orgánica mineral inhibe la reacción de sales que afectan el desarrollo inicial de los cultivos.



TU CULTIVO, NUESTRA PASIÓN

MartiMax

Foliar

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (%)

Nitrógeno (N)	20.00
Fósforo (P ₂ O ₅)	15.00
Potasio (K ₂ O)	20.00
Complejo de (L-Aminoácidos): Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Cisteína, Fenilalanina, Treonina, Triptófano, Valina, Hidroxiprolina, Tirosina, Histidina, Alanina, Aspártico, Prolina, Glicina, Isoleucina, Glutámico.	2.00
Complejo de Vitamina B: B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotina, Ácido Pantoténico, Vitamina C.	5000 ppm
Complejo de Microelementos Quelatados; Boro, Cobre, Fierro, Manganeso, Molibdeno, Zinc.	500 ppm
Fulvato Organico Mineral	1.00
Agentes Carboxilados	500 ppm
Acondicionadores	40.95
Total	100.00

MartiMax

Foliar 

CULTIVOS		DOSIS LT/HA	MÉTODO
Repollo Brócoli Lechuga Calabacita Melón Sandía Zanahoria Rábano Tomate cáscara	Jitomate Pepino Papa Cebolla Cebollín Chile Nopal Chicharo	1.0 - 2.0	-Se aplica a los 15 días después del trasplante. -Mantenimiento vegetativo. -Estrés por causa de frío o calor. -Inducción de brotación de nuevas yemas. -Inicio de floración.
Guayaba, Limón Naranja Café Papaya	Durazno Aguacate Manzana Nogal Mango	2.0 - 3.0	-Aplicar al inicio del brote de yemas vegetativas. -Aplicar al inicio de floración. -Aplicar al llenado de fruto. -Aplicar en las etapas de mayor demanda de nutrientes
Ornamentales: Rosa, Gerbera, Crisantemo.		1.0 - 2.0	Al inicio del botón floral. Después de cada poda.
Forrajes: Alfalfa, Avena, Pastos, Forrajeros, Leguminosas		2.0 - 3.0	Aplicar cuando tenga de 4 a 6 hojas verdaderas
Maíz, Sorgo, Cereales		2.0 - 3.0	Aplica en etapa V5 - V6 en maíz y sorgo en cereales al 1.er . Entrenudo
Fresa, Frambuesa, Arándano, Uva y Zarcamora		2.0 - 3.0	Aplicar al inicio de la floración y durante la fructificación